

English version follows.

新型コロナウイルスワクチン接種について

20210614、20210623、20210802 改訂

・概要 広島大学ホームページ <https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/65137>

・新型コロナウイルスワクチン接種後の注意事項

◆副反応

モデルナ社製新型コロナウイルスワクチンは、接種後に軽度から中程度の注射部位の痛み・腫れ、疲労、頭痛、筋肉痛、寒気、関節痛、悪心・嘔吐、リンパ節症及び発熱等があることが報告されています。重篤なものには、まれですが、アナフィラキシー（全身性の高度のアレルギー反応）等があります。1回目よりも2回目の接種の後に多く、若い方に多い傾向が見られます。（厚生労働省：武田/モデルナ社の新型コロナウイルスワクチンについて）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_moderna.html

ワクチン接種後、接種会場で15～30分経過を見ます。万が一アナフィラキシーが起きても医療従事者が必要な対応を行います。

※市販の解熱鎮痛薬（アセトアミノフェン：タイレノール A、パファリンルナ J など）で対応いただくこともご検討ください（厚生労働省：新型コロナウイルスワクチン Q&A）。

<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0007.html>

広島大学保健管理センターではワクチンの副反応に対する解熱鎮痛薬等の処方を行いません。



◆相談窓口

ワクチン接種後に副反応を疑う症状が出た方は、まず、かかりつけ医など身近な医療機関を受診してください。かかりつけ医がない場合は、「救急医療 NET HIROSHIMA」をご参照ください。

<http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/kenmintop/>



新型コロナウイルスワクチン接種に関する問い合わせ（副反応に関することも含む）は「広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター」にお願いします（082-513-2847、全日24時間受付）。

◆医療機関情報

[広島県 病院検索サイト](#)

[東広島地区救急当番表\(夜間・休日の当番医\)](#)

[広島市医師会千田町夜間急病センター\(内科・眼科\)082-504-9990](#)

参考

・厚生労働省：武田/モデルナ社の新型コロナウイルスワクチンについて、

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_moderna.html

・広島県:新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応への対応について、

<https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/coronafukuhannou.html>

About new coronavirus vaccination

20210614, rev. 20210623, 20210802

▪ **Outline** Homepage of Hiroshima University,

<https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/65137>

▪ **Precautions after vaccination with new coronavirus**

◆ Adverse events

It has been reported that the new coronavirus vaccine manufactured by Moderna has mild to moderate pain and swelling at the injection site, fatigue, headache, myalgia, chill sensation, joint pain, nausea / vomiting, lymphadenopathy, and fever after inoculation. Severe ones, rarely, include anaphylaxis (a high degree of systemic allergic reaction). It is more common after the second inoculation than the first, and tends to be more common in younger people.

After vaccination, please stay at the vaccination site for 15 to 30 minutes. In the case of anaphylaxis, healthcare professionals take the necessary actions.

Please consider using over-the-counter antipyretic analgesics (acetaminophen: Tylenol A, bufferin Luna J, etc.) (Ministry of Health, Labor and Welfare: New Corona Vaccine Q & A)

<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0007.html>

Health Service Center, Hiroshima University, does not prescribe antipyretic analgesics for adverse events of vaccines.

◆ Consultation

If you have adverse events after vaccination, first consult your family doctor or other familiar medical institution. If you do not have a family doctor, please refer to "Emergency Medical NET HIROSHIMA".

<http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/kenmintop/>



For inquiries regarding the new coronavirus vaccination including adverse events, please contact the "Hiroshima Prefecture New Coronavirus Vaccination Call

Center” (082-513-2847, accepted 24 hours a day).

◆Medical institution information

[広島県 病院検索サイト](#)

References:

- Ministry of Health, Labor and Welfare: Takeda / Moderna’s new corona vaccine, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_moderna.html
- Hiroshima Prefecture: How to deal with adverse events after vaccination with the new coronavirus, <https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/coronafukuhannou.html>